

EXTRACCIÓN DE BULBO CON ZONAS EN PUDRICIÓN



El cuello de la planta empieza a pudrir. El tratamiento comienza a afectar a todas las zonas de crecimiento



Ya se ha producido necrosis en los vasos que conducen la sabia



22/07/2019: VALORACIÓN DE RESULTADOS



VER VÍDEO

Durante cuatro semanas hemos estado evaluando el efecto del herbicida y de las dos materias activas empleadas: Herbikon (con rimsulfurón, nicosulfurón y dicamba) y Permit (con Halosulfuron-metil al 75 %).

Esta finca tenía unas pequeñas salidas de *Chenopodium album* (fariñento), habitual en esta zona, y el efecto de la dicamba ha sido bueno para el control de esas pequeñas nascencias y de alguna otra que también existía. No obstante, el problema principal ha sido, sin duda, con el *Cyperus rotundus* y la *Echinochloa crus-galli*, ya que estas dos hierbas producen unas sustancias que provocan que no pueda existir competencia con otras especies.

Durante esta campaña, en esta finca, que lleva muchos años con estas proporciones tan ingentes de estas dos especies, no ha habido nascencia o competencia de otras hierbas. El maíz está en la tercera visita a pleno crecimiento: apuntan entre 9 y 10 hojas, las integrales térmicas proporcionan en la última semana un crecimiento bastante espectacular y no se espera que la competencia de otras posibles hierbas, que lógicamente siempre pueden salir, supongan un problema.



En la tercera visita, tras el tratamiento combinado con Herbikon y Permit, el maíz está en pleno crecimiento, con entre 9 y 10 hojas

En definitiva, la necrosis en los bulbos es clara; por lo tanto, la eficacia conjunta de nuestros productos queda testada. De cara a futuras campañas, habrá que tener en cuenta que esta reducción es paulatina e implicará nuevas aplicaciones año tras año hasta erradicar el problema por completo.