

"Volver a la granja familiar fue un paso adelante"



En vídeo

Moro del Castillo aseguró su relevo gracias al cambio de vida de Belén García. Regresó desde la ciudad para gestionar la ganadería de casa junto a su marido, que era una persona ajena a las vacas. En este #YoSoyCampo conocemos su historia, basada en el cariño por los animales y en la reivindicación de que el sector no tiene género.

Belén García probó a trabajar lejos de casa y a mantener un estilo de vida nada parecido al del campo. No obstante, pasado un tiempo decidió volver a su localidad natal, Castillo de Bayuela, para continuar con la granja de vacuno de leche que había fundado su abuelo: Ganadería Moro del Castillo.

"Nunca imaginé que iba a acabar donde todo empezó", declara Belén, que trabajó unos años en Madrid como conductora de ambulancias. "Era una vida muy diferente, pero venir al pueblo era lo que me hacía feliz", destaca. Aunque en el sector lácteo también se pueden dar situaciones de emergencia, Belén remarca "la tranquilidad del campo" y "el gusto por los animales".

Con el apoyo de su marido, ajeno en ese momento a todas las funciones de una granja de leche, comenzó una nueva etapa. En Castillo de Bayuela le esperaba un negocio familiar, que de su abuelo había pasado a las manos de su padre y de su tío. "Para mucha gente sería un retroceso, pero para mí fue un paso adelante", confiesa.

En la actualidad, Moro del Castillo alberga unas seiscientas cabezas de animales, de los cuales unas trescientas veinte se corresponden con vacas en lactación. Su filosofía es "hacer siempre lo que se pueda para que las vacas se queden el mayor tiempo posible con nosotros", señala.

"Tengo animales que los he criado desde pequeños y les tengo mucho cariño. Para mí es igual que los cuidados de mi perro, por ejemplo, cuido a mis vacas y, si a alguna le pasa algo, lo sufro. Nos preocupamos más nosotros que cualquier persona que no viva este mundo, porque son animales muy sentidos. Ellos te valoran con cualquier acción que hagas; igual que si un día no ordeñas a la hora habitual, se nota. Son las primeras que te avisan y se ponen en huelga de ordeño. Es como trabajar bajo presión, pero porque ellas son las jefas", relata.

Belén reconoce que "ser ganadera es bastante difícil" y manifiesta los problemas que sufre por ser mujer: "Todavía existen personas que se asombran al verme manejar maquinaria pesada o tomar decisiones relacionadas con la producción de los animales". Con todo, quiere dejar claro un mensaje positivo: "Cada vez somos más mujeres al frente de ganaderías, la pasión no tiene género".

Aunque su caso no es lo común, Belén lo reivindica. "Este estilo de vida se está perdiendo, pero levantarse cada día, llegar a las instalaciones y comprobar que las vacas están bien, siempre reconforta a pesar del madrugón. El ritmo de vida del campo es muy diferente al que yo tenía en Madrid, pero estoy feliz de continuar con el legado familiar. Mi abuelo plantó la semilla, mi padre y mi tío crearon lo que tenemos ahora y yo, gracias a ellos, puedo vivir de esto", sentencia.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



Conoce el adyuvante que marca la diferencia

MONTANIDE ISA 206 VG, PARA EL DESARROLLO DE UNA INMUNIDAD RÁPIDA Y DURADERA



Úsalo las veces que necesites durante los 10 días siguientes a su apertura

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPARATIVA DEL MONTANIDE FRENTE A OTROS ADYUVANTES



VISITA AQUÍ EL VIDEO SOBRE EL MODO DE ACCIÓN DE MONTANIDE



BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA – Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adyuvante: Montanide ISA 206 VG 1.6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 – 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) – **Nº reg:** 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd – Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

