

"Volver á granxa familiar foi un paso adiante"



En vídeo

Moro del Castillo asegurou a súa remuda grazas ao cambio de vida de Belén García. Regresou desde a cidade para xestionar a gandería da casa xunto ao seu home, que era unha persoa allea as vacas. Neste #YoSoyCampo coñecemos a súa historia, baseada no cariño polos animais e na reivindicación de que o sector non ten xénero.

Belén García probou traballar lonxe da casa e mantivo un estilo de vida nada semellante ao do campo. Porén, pasado un tempo, decidiu regresar á súa localidade natal, Castillo de Bayuela, para continuar coa granxa de vacún de leite que fundara o seu avó: Ganadería Moro del Castillo.

"Nunca imaxinei que acabaría onde todo comezou", declara Belén, que traballou durante uns anos en Madrid como conductora de ambulancias. "Era unha vida moi diferente, pero vir o meu lugar de orixe era o que me facía feliz", destaca. Aínda que no sector lácteo tamén se poden dar situacións de emerxencia, Belén salienta "a tranquilidade do campo" e "o gusto polos animais".

Co apoio do seu home, alleo nese momento a todas as funcións dunha granxa de leite, comezou unha nova etapa. En Castillo de Bayuela agardábaa un negocio familiar, que do seu avó pasara ás mans do seu pai e do seu tío. "Para moita xente sería un retroceso, pero para min foi un paso adiante", confesa.

Na actualidade, Moro del Castillo alberga unhas seiscentas cabezas de gando, das cales unhas trescentas vinte se corresponden con vacas en lactación. A súa filosofía é "facér sempre todo o necesario para que as vacas queden o maior tempo posible connosco", sinala.

"Teño animais que criei desde pequenos e téñolles moito cariño. Para min é igual ca cos coidados do meu

can, por exemplo: coido as miñas vacas e, se a algunha lle pasa algo, sufro. Preocupámonos máis nós ca calquera persoa que non viva este mundo, porque son animais moi sensibles. Elas valóranse con calquera acción que fagas; mesmo se un día non moxes á hora habitual, nótase. Son as primeiras en avisarte e póñense en folga de muxido. É coma traballar baixo presión, pero porque elas son as xefas", relata.

Belén recoñece que "ser gandeira é bastante difícil" e manifesta os problemas que sofre por ser muller: "Aínda existen persoas que se sorprenden ao verme manexar maquinaria pesada ou tomar decisións relacionadas coa produción dos animais". Con todo, quere deixar clara unha mensaxe positiva: "Cada vez somos máis mulleres á fronte de ganderías, a paixón non ten xénero".

Aínda que o seu caso non é o máis común, Belén reivindícao. "Este estilo de vida estase a perder, pero erguerse cada día, chegar ás instalacións e comprobar que as vacas están ben sempre reconforta, malia a madrugada. O ritmo de vida do campo é moi diferente ao que eu tiña en Madrid, pero estou feliz de continuar co legado familiar. O meu avó botou a semente, meu pai e meu tío crearon o que temos agora e eu, grazas a eles, podo vivir disto", conclúe.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



Conoce el adyuvante que marca la diferencia

MONTANIDE ISA 206 VG, PARA EL DESARROLLO DE UNA INMUNIDAD RÁPIDA Y DURADERA



Úsalo las veces que necesites durante los 10 días siguientes a su apertura

CONSULTA AQUÍ LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPARATIVA DEL MONTANIDE FRENTE A OTROS ADYUVANTES



VISITA AQUÍ EL VIDEO SOBRE EL MODO DE ACCIÓN DE MONTANIDE



BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** VNT - test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT - test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA - Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adyuvante: Montanide ISA 206 VG 1,6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 - 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) - N° reg: 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

